Questionnaire

Questionnaire pour identifier les douleurs d'effort du membre inférieur

Ce questionnaire a pour but d'avoir plus de connaissances et d'informations sur votre pathologie due à l'effort au membre inférieur.

1. Nom / Prénom : _____

2. Age : _____

3. Taille (cm) : _____

4. Poids actuel : _____

5. Poids au moment des premières douleurs

6. Quelle est votre discipline sportive ?

Athlétisme

Course à pied

Basket-ball

Football

Tennis

Volley-ball

Autre : _____

7. Combien d'année(s) de pratique avez-vous ?

8. Combien d'entraînements par semaine faites-vous ?

(Matches compris)

< ou = 3

4 à 5

6 à 7

> 7

9. Quels sont vos antécédants médicaux (traumatismes et blessures sportives)

Aucun

Autre : _____

10. Êtes vous fumeur ?

Oui (quelle fréquence ?) _____

Non

Apparition de la douleur

10. A quel moment se produit la douleur ?

A l'effort

Après l'effort

Au repos

La nuit

Autre : _____

11. Comment survient la douleur / sensibilité ?

Choisir 1 ou plusieurs propositions

La douleur apparaît initialement comme légère après une quantité spécifique d'exercice, puis disparaît

La douleur apparaît au début de l'exercice, peut disparaître pendant et revenir à la fin de l'activité

La douleur est présente tout au long de l'activité

La douleur survient surtout au cours de la course à pied d'endurance

La douleur est provoquée par l'activité, exacerbée par un exercice continu

La douleur apparaît souvent au niveau de la jambe postérieure et survient après un exercice intense ou vigoureux

Autre : _____

12. A quelle(s) période(s) sont apparues les 1ères douleurs ?

Choisir 1 ou plusieurs propositions

Après une période d'arrêt relatif

Pré-saison ou début de saison sportive

Milieu de saison sportive (quelques mois après reprise ou début du sport concerné)

Fin de saison sportive

Début de la période compétitive

Milieu de la période compétitive

Fin de la période compétitive

Pas de période spécifique

Autre : _____

13. Précisez la date de survenue (Mois / Année)

14. Quelle(s) proposition(s) correspond(ent) le plus à votre situation ?

Choisir 1 ou plusieurs propositions/ Insidieux = douleur supportable apparaissant bénigne au début

- Douleur au début insidieux, avec aggravation progressive et localisée
- Douleur aiguë d'emblée, invalidante et durable après l'effort
- Douleur sourde et récurrente
- Douleur stéréotypée qui revient pour le même effort (intensité ou durée)
- Douleur à type de crampe, brûlure, douleur du compartiment concerné avec sensation de gonflement accru, de tension, d'augmentation de volume
- Douleur au genou ou à la jambe médiale qui entraîne une boiterie
- Boiterie survenant typiquement à la montée d'escaliers ou à la course
- Autre : _____

15. Y a-t-il des facteurs extrinsèques déclenchants ?

Choisir 1 ou plusieurs propositions/ Insidieux

- Non
- Changement d'activité
- Reprise d'entraînement
- Modification de l'entraînement (technique, intensité, durée, charge d'entraînement par semaine)
- Changement de terrain ou de sol
- Usure des chaussures ou nouvelle paire
- Après traumatisme, chirurgie, blessures répétitives (entorses, fractures)
- Autre : _____

16. Le problème dure (ou a duré) combien de temps ?

17. Quels efforts vous procurent la douleur en question ?

18. Quels sont ceux qui ne déclenchent pas cette douleur ?

Localisation

19. Où est située la douleur ?

Une seule réponse possible

- Antérolatérale de la jambe
- Postéro-médiale de la jambe
- Postérieure (mollet)
- Face médiale du tibia, partie basse (1/3 inférieur)
- Latérale de la jambe (photos)
- Postérieure profonde (mollet en profondeur)
- Postérieure superficielle (mollet en superficielle)
- Postero-médial du tibia
- Bord antérieur du tibia
- Au-dessus du 1/3 distal du tibia
- Pied et jambe en latéral
- Mollet et dos du pied face latérale
- Autre : _____

20. Est-ce bilatéral ?

(La douleur est présente des 2 côtés)

- Oui
- Non

Evolution

Evolution de la douleur depuis son apparition ?

21. Comment a évolué la douleur ? (Sans réelle interruption)

- Rapide (jours ou semaines)
- Moyenne (semaines ou mois)
- Lente (années)

22. Comment qualifieriez-vous son évolution ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- La douleur revient généralement à la même intensité ou même intervalle d'activité
- La douleur est exacerbée par un exercice continu
- La douleur progresse et peut devenir sévère, se manifeste dès les premiers exercices, ainsi qu'après cessation de l'activité
- La douleur peut avoir un caractère aigu quand vous continuez l'activité malgré des douleurs d'effort intenses
- La douleur oblige rarement à l'arrêt de l'effort
- Autre : _____

Régression

23. La douleur régresse-t-elle pendant ou au cours de l'effort ?

- Oui
- Non

24. La douleur disparaît-elle au repos ?

- Oui
- Non

25. En combien de temps cède la douleur après l'effort

- 10 min (jusqu'à quelques heures)
- Quelques heures à 1 jour
- Durable après l'effort (pas de régression réelle)
- 1 heure (jusqu'à quelques heures)
- De façon instantanée

Autopalpation et observation

Cette rubrique concerne tout ce que vous avez pu remarquer concernant la ou les zones douloureuses

26. Au repos, quelles sont vos sensations ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- Sensibilité à type de paresthésie (brûlure, fourmillement)
- Observation d'une hernie musculaire
- Douleur 1/3 inférieur bord postéro-médial du tibia
- Normale, pas de douleur particulière
- Faiblesse musculaire avec parfois paresthésies provoquées au toucher
- Douleur, sensibilité localisée
- Autre : _____

27. A la palpation que remarquez-vous ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- Palpation douloureuse sur 10 à 15 cm dans la partie inférieure et médiale du tibia
- Sensibilité palpable localisée (col de la fibula, partie antéro médiale et supérieure du tibia)
- Sensibilité palpable diffuse et dureté musculaire douloureuse (palpation immédiate après l'effort)
- Palpation d'une hernie musculaire focale (petite boule)
- Palpation douloureuse en un point précis sur le tibia avec possible tuméfaction
- Autre : _____

28. Avez-vous observé un léger gonflement ?

- Oui *Passez à la question 29*
- Non *Passez à la question 30*

Localisation du gonflement

29. Où est situé le gonflement ?

- Tibia
- Diffus dans le mollet (augmentation du volume / circonférence du mollet)
- Autour du genou
- Localisé, zone précise

Consultation médicale

30. Quel a été le délai entre les 1ères douleurs et la consultation médicale ?

- D'emblée à quelques semaines (1 mois, maxi 2)
- Quelques semaines (1 à 2 mois)
- Quelques mois à quelques années

31. Quel diagnostic a été posé ?

Examens complémentaires

32. Avez-vous fait des examens complémentaires ?

(Imagerie médicale, bilan sanguin, etc...)

- Oui *Passez à la question 33*
- Non *Passez à la question 34*

33. Quel(s) étai(ent) ces examens ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- Bilan sanguin
- Radiographie
- Echographie
- Scintigraphie
- IRM (imagerie par résonance magnétique)
- ARM (angiographie sous résonance magnétique)
- EMG (électromyographie)
- Echo-doppler dynamique avec manoeuvre provocatrice (genou tendu, flexion dorsale passive du pied ou flexion plantaire active du pied)
- PIM : mesure de la Pression Intra Musculaire
- Autre : _____

Traitement

34. Quels traitements sont mis en place ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- Renforcement musculaire, mobilisations, massage, étirements, etc
- Semelles orthopédiques
- Cryothérapie
- Ondes de choc
- Mésothérapie
- Autre : _____

35. Avez-vous déjà fait des séances de kiné pour cette douleur ?

(Choisir 1 ou plusieurs propositions)

- Oui *Passez à la question 36*
- Non *Passez à la question 38*

36. Qu'aviez-vous fait lors de vos séances de kiné ?

37. Est-ce que ce traitement vous a semblé efficace ?

38. Quels sont vos attentes avec les séances de kiné ?

39. Commentaires en plus ?

**Retrouvez davantage de
ressources utiles en
kinésithérapie sur Fullphysio**