

Phimosis

يتوافق الشبم مع تضيق نهاية القلفة مما يمنع كشف الحشفة تمامًا (التراجع).

يعتبر وجود الشبم عند الولادة وعند الأطفال الصغار جدًا أمرًا طبيعيًا. يختفي هذا الشبم في معظم الحالات مع نمو الطفل.

يمكن التفكير في التخامت مع الشبم إذا استمر بعد سن حوالي 6 سنوات ، أو في إحدى الحالات التالية:

- عدم القدرة على إعادة غطاء الحشفة (البارافيموسيس) ؛
- عدم الراحة في التبول.
- عدوى القلفة.
- مرض جلدي على القلفة.
- تشوه المسالك البولية أو التناسلية لتجنب التهابات المسالك البولية.

استشر على وجه السرعة في حالة تغطية الحشفة مع استحالة تلخيصها. هذه الحالة التي تسمى البارافيموسيس تؤدي إلى خنق الحشفة ، مما يمنعها من الري بالدم. في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي البارافيموز المطول إلى تدمير دائم لكل الحشفة أو جزء منها.

يحدث البارافيموسيس بشكل خاص في حالة الانتصاب ، أو التراجع القسري للأشخاص الذين يعانون من الشبم. من الضروري عدم فرض تغطية حشفة.