Conseils - PrEP schéma continu

- تناول قرصًا واحدًا يوميًا في وقت محدد مع وجبة أو وجبة خفيفة.
- العلاج يكون فعالًا بشكل كامل فقط بعد 7 أيام. لا تتوقف عن العلاج خلال 7 أيام من ممارسة الجنس غير الآمن.

- كن حذرًا ، الالتزام غير الكامل بالعلاج يضر بفعاليتته.
- يجب أن يكون اتباع نظام العلاج الوقائي قبل التعرض مصحوبًا باستمرار الإجراءات الأخرى للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا (الواقي ، إلخ).
- في حالة الجماع بدون حماية والالتزام الناقص بالعلاج ، استشر فورًا من أجل احتمال إجراء علاج ما بعد التعرض.
- قد تعاني من آثار جانبية مثل الغثيان الخفيف والإسهال وآلام البطن و / أو الصداع. عادة ما تختفي هذه الأعراض في غضون بضعة أسابيع. استشر طبيبك في حالة الأعراض الشديدة أو المستمرة.
- لا تتناول العقاقير المضادة للالتهابات أو أي علاج آخر دون التحدث مع طبيبك ، بسبب خطر التفاعلات.
- إذا كنت تواجه صعوبة في ابتلاع القرص ، قم بإذابه في القليل من الماء (أو العصير برتقال أو عنب) وخذها على الفور.
- إذا حدث القيء في غضون ساعة من تناوله ، تناول قرصًا آخر. لا تتناول قرصًا آخر إذا تقيأت بعد أكثر من ساعة من تناوله.
- لا تستهلك الفحم المنشط أو ضمادات المعدة قبل أقل من ساعتين من العلاج أو بعده.