

Information de prise de moxifloxacin

معلومات عن تناول موكسيفلوكساسين

قد تسبب المضادات الحيوية الفلوروكينولون) بما في ذلك موكسيفلوكساسين (آثارًا جانبية ، والتي قد تظهر لمدة تصل إلى شهر واحد بعد التوقف عن العلاج. بشكل عام ، هذه الآثار ليست خطيرة وتختفي عند توقف العلاج. ومع ذلك ، في حالات نادرة ، قد تكون هذه الآثار خطيرة أو لا رجعة فيها.

لذلك يُنصح بالاتصال بطبيبك بمجرد ظهور الأعراض التالية:

- تورم مؤلم في الأوتار أو المفاصل
- ألم غير عادي و / أو ضعف في الذراعين أو الساقين
- خفقان القلب أو الشعور بعدم انتظام ضربات القلب أو تسارعها
- صعوبة في التنفس ، تورم في الساقين
- ضعف الرؤية أو ظهور أي اضطراب آخر في العين.
- احمرار أو تهيج أو حكة على الجلد ، خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية (مصباح الدباغة ، مقصورة الشمس الاصطناعي ، إلخ).
- يتطلب ظهور آلام في البطن أو الصدر أو الظهر بشكل مفاجئ وشديد التوجه فورًا إلى قسم الطوارئ في المستشفى.