

Ne pas avoir de rate fonctionnant correctement expose votre enfant à un risque d'infection sévère et d'aggravation rapide.

Cependant, il existe des mesures efficaces pour réduire ce risque.

- **Pour limiter le risque d'infection grave :**

- Si un traitement antibiotique préventif a été prescrit, veillez à ce qu'il soit pris tous les jours.
- Veillez à ce que les vaccinations de votre enfant soient à jour. Attention, votre enfant nécessite des vaccins parfois différents de ceux des autres enfants, parlez-en avec votre médecin.
- Prévenez tout professionnel de santé prenant en charge votre enfant de son état (asplénisme).
- Consultez avant tout voyage à l'étranger.

- **En cas de fièvre :**

- **Ne banalisez pas la fièvre.** Consultez en urgence (ouappelez le 15) devant toute fièvre, même si elle ne vous semble pas inquiétante.
- Prévenez le médecin prenant votre enfant en charge de son état (asplénisme).
- Rappelez que dans son cas, si la cause de la fièvre n'est pas connue et en l'absence d'allergie aux antibiotiques, une antibiothérapie par céphalosporine de 3ème génération parentérale doit être débutée dès les prélèvements réalisés (vous pouvez également lui montrer cette ordonnance).

En cas d'oublis fréquents de ces consignes, conservez cette ordonnance (ou une photo) sur vous et présentez-la à tout professionnel de santé prenant votre enfant en charge.